

附件 3(略)

附件 4

## 复方酚溶液等 4 种兽药产品说明书和标签

### 一、复方酚溶液说明书和标签

#### (一) 复方酚溶液说明书

兽用

##### 【兽药名称】

通用名：复方酚溶液

商品名：卫可®浩普 (Virkon® LSP)

英文名：Compound Phenols Solution

汉语拼音名：Fufangfen Rongye

【性状】 本品为澄清至略微浑浊的绿褐色液体，有醋酸味和酚味。

【主要成分】 邻苯基苯酚和对氯间甲酚

【药理作用】 邻苯基苯酚、对氯间甲酚通过使菌体蛋白凝固变性而呈现杀菌作用。碱性环境、脂类和皂类等能减弱其杀菌作用。对动物和人有较强毒性，不能用于创面和皮肤的消毒。

【用途】 用于动物圈舍表面、器具、设备的消毒。

【用法与用量】 稀释后喷雾使用，每 1 平方米用量 300ml。稀释比例：动物圈舍表面 1:200；器具设备 1:400。疾病发生时，禽流感和新城疫 1:200；猪蓝耳病 1:400；大肠杆菌 1:400；支原体、沙门氏菌 1:200。

【不良反应】 按规定用法用量使用，未见不良反应。

【注意事项】 (1) 本品不适用于奶牛场或牛奶生产/处理设备。

(2) 对皮肤、粘膜有刺激性和腐蚀性，避免接触眼睛及皮肤。

(3) 仔细阅读标签说明书并严格遵守。

【规格】 100g:邻苯基苯酚 (C<sub>12</sub>H<sub>10</sub>O) 12g+对氯间甲酚 (C<sub>7</sub>H<sub>7</sub>ClO) 12g

【包装】

【贮藏】 遮光，密封保存。

【有效期】 2 年。

【进口兽药注册证号】

【生产企业】 安德国际有限公司 (Antec International Limited)

地址：Windham Road, Chilton Industrial Estate, Sudbury, Suffolk, CO102XD, United Kingdom.

## （二）复方酚溶液标签

兽用

### 【兽药名称】

通用名：复方酚溶液

商品名：卫可®浩普（Virkon® LSP）

英文名：Compound Phenols Solution

汉语拼音：Fufangfen Rongye

【主要成分】 邻苯基苯酚和对氯间甲酚

【用途】 用于动物圈舍表面、器具、设备的消毒。

【用法与用量】 稀释后喷雾使用，每1平方米用量300ml。稀释比例：动物圈舍表面1:200；器具设备1:400。疾病发生时，禽流感和新城疫1:200；猪蓝耳病1:400；大肠杆菌1:400；支原体、沙门氏菌1:200。

【不良反应】 按规定用法用量使用，未见不良反应。

【注意事项】 （1）本品不适用于奶牛场或牛奶生产/处理设备。

（2）对皮肤、粘膜有刺激性和腐蚀性，避免接触眼睛及皮肤。

（3）使用期仔细阅读标签说明并严格遵守。

【规格】 100g:邻苯基苯酚（C<sub>12</sub>H<sub>10</sub>O）12g+对氯间甲酚（C<sub>7</sub>H<sub>7</sub>ClO）12g

【包装】

【生产日期】

【生产批号】

【有效期至】

【贮藏】 遮光，密封保存。

【进口兽药注册证号】

【生产企业】 安德国际有限公司（Antec International Limited）

地址：Windham Road, Chilton Industrial Estate, Sudbury, Suffolk, CO102XD, United Kingdom.

## 二、氟尼辛葡甲胺注射液说明书和标签

### （一）氟尼辛葡甲胺注射液说明书

兽用

### 【兽药名称】

通用名：氟尼辛葡甲胺注射液

商品名：喜炎净（MEGLUXIN）

英文名：Flunixin meglumine injection

汉语拼音：Funixin Pujia'an Zhushuye

**【主要成分】** 氟尼辛葡甲胺

**【性状】** 本品为无色至微黄色澄明液体。

**【药理作用】** 氟尼辛葡甲胺是一种解热镇痛非甾体类抗炎药。它是环氧化酶（COX）非选择性和可逆性的抑制剂，COX 可以将花生四烯酸转化为不稳定的循环内过氧化物，然后再转变成前列腺素，环前列腺素和凝血噁烷等。一些前列腺素类化合物，如前列腺素参与了炎症、疼痛和发热等病理生理作用机制。因此，氟尼辛葡甲胺可以通过抑制环氧化酶而起到解热、镇痛、抗炎等作用。

**【适应证】** 本品用于辅助治疗母猪乳房炎-子宫炎-无乳综合征。

**【用法与用量】** 以氟尼辛计。肌肉注射：一次量，每 1kg 体重，猪 2.2mg（相当于每 10kg 体重使用本品 0.44 ml），给药 1~2 次（给药次数根据临床症状决定），两次给药时间间隔 12 小时。

**【不良反应】** 注射部位偶见轻度反应。

**【注意事项】** 1.禁止用于肝肾功能不良、患有血液疾病、对氟尼辛葡甲胺过敏、脱水及血容量或血压降低的动物。

2.给药后 24 小时内禁止使用其他非甾体类抗炎药。

3.禁止给药剂量超过推荐剂量或者进行长期给药。在给小于 6 周龄或者老年动物用药时存在一定的风险，因此给药剂量要相应减少同时要仔细观察用药后的临床反应。

4.未用完的产品或包装材料应根据当地法律规定处理。

5.对非甾体类抗炎药过敏的工作人员禁止接触本品。

**【休药期】** 猪 17 日。

**【规格】** 按  $C_{14}H_{11}F_3N_2O_2$  计算（1）50ml:2.5g （2）100ml: 5g （3）250ml:12.5g

**【包装】**

**【贮藏】** 遮光，密闭，25℃条件下干燥保存。

**【有效期】** 3 年；开启后有效期为 28 日。

**【进口兽药注册证号】**

**【生产企业】** 西班牙海博莱生物大药厂（LABORATORIOS HIPRA S.A.）

地址：AVDA. LA SELVA, 135. 17170-AMER (GIRONA), SPAIN

## （二）氟尼辛葡甲胺注射液标签

兽用

**【兽药名称】**

通用名：氟尼辛葡甲胺注射液

商品名：喜炎净 (MEGLUXIN)

英文名：Flunixin meglumine injection

汉语拼音：Funixin Pujia'an Zhusheye

【主要成分】 氟尼辛葡甲胺

【适应证】 本品用于辅助治疗母猪乳房炎-子宫炎-无乳综合征。

【用法与用量】 以氟尼辛计。肌肉注射：一次量，每 1kg 体重，猪 2.2mg（相当于每 10kg 体重使用本品 0.44 ml），给药 1~2 次（给药次数根据临床症状决定），两次给药时间间隔 12 小时。

【休药期】 猪 17 日。

【规格】

【包装】

【生产日期】

【生产批号】

【有效期至】

【贮藏】 遮光，密闭，25℃条件下干燥保存。

【进口兽药注册证号】

【生产企业】 西班牙海博莱生物大药厂（LABORATORIOS HIPRA S.A.）

地址：AVDA. LA SELVA, 135. 17170-AMER (GIRONA) , SPAIN

### 三、氯前列醇钠标签

#### 氯前列醇钠标签

兽用

【兽药名称】

通用名：氯前列醇钠

商品名：

英文名：Cloprostenol Sodium

汉语拼音：Lüqianliechunna

【主要成分】 氯前列醇钠

【包装】

【生产日期】

【生产批号】

【有效期至】

【贮藏】 密封，凉暗处保存。

【运输注意事项】 保持干燥及避光。

【兽药注册证号】

【生产企业】 台湾永光化学工业股份有限公司第二厂

地址：桃园县观音乡树林村工业三路 12 号

## 四、伊维菌素双羟萘酸噻嘧啶咀嚼片说明书和标签

### （一）伊维菌素双羟萘酸噻嘧啶咀嚼片说明书样稿

兽用

#### 【兽药名称】

通用名称：伊维菌素双羟萘酸噻嘧啶咀嚼片

商品名称：犬心保（Heartgard® Plus）

英文名称：Ivermectin and Pyrantel Pamoate Chewable Tablets

汉语拼音：Yiweijunsu Shuangqiangnaisuan Saimiding Jujuepian

【主要成分】 伊维菌素、双羟萘酸噻嘧啶

【性状】 本品为红至红褐色，略带黄色咀嚼片。

【药理作用】 抗蠕虫药。伊维菌素对寄生在动物体表的节肢动物和体内的线虫具有良好的驱杀作用。伊维菌素可促进寄生虫的突触前神经元释放  $\gamma$ -氨基丁酸(GABA)，使 GABA 介导的氯离子通道开放。伊维菌素对无脊椎动物神经和肌肉细胞位于 GABA 介导位点附近的谷氨酸介导的氯离子通道也具有选择性高亲和力，从而干扰神经肌肉间的信号传递，使虫体松弛麻痹，导致虫体死亡或被排出体外。

噻嘧啶作用机理是对敏感虫体产生一种去极化型的神经肌肉阻断作用，使虫体麻痹，通过胃肠道蠕动将虫体排出体外。噻嘧啶的双羟萘酸盐在水中的溶解度很低，极少从肠道吸收，使其能到达肠道的后段，发挥驱虫活性。

【适应证】 通过清除犬心丝虫幼虫来预防犬心丝虫病，治疗和控制犬蛔虫（犬弓首蛔虫、狮弓蛔虫）病和钩虫（犬钩口线虫、狭头钩口线虫、巴西钩口线虫）病。

【用法与用量】 以本品计。口服：体重在 11kg 以下的犬，S 片一片，体重在 12~22kg 的犬，M 片一片，体重在 23~45kg 的犬，L 片一片，体重在 45kg 以上的犬可用不同规格片配合使用。每月一次。

【不良反应】 （1）当犬体内存在微丝蚴时，使用本品，可能出现轻微的超敏性反应，特别是犬出现临时腹泻，可能与体内存在濒死或已死的微丝蚴有关。

（2）某些犬特别是牧羊犬对伊维菌素敏感，在用本品时，可能导致动物发生多种反应，如：瞳孔散大、精神沉郁、共济失调、震颤、流涎、局部麻痹、兴奋、恍惚昏睡以及死亡。

【注意事项】 （1）建议用于 6 周龄以上的犬。

(2) 在使用本品治疗前，应检查所有犬的心丝虫感染情况。在感染后一个月内（30天）给药，可清除犬心丝虫幼虫。本品对犬心丝虫成虫无效。

(3) 对感染犬首次使用本品之前，应除去犬体内的犬心丝虫成虫和微丝蚴。

(4) 应在服药后观察8小时，一旦出现不适症状，立即联系兽医。

**【休药期】** 无。

**【规格】** (1) S片：伊维菌素 68 $\mu$ g+双羟萘酸噻嘧啶 163 mg

(2) M片：伊维菌素 136 $\mu$ g+双羟萘酸噻嘧啶 326 mg

(3) L片：伊维菌素 272 $\mu$ g+双羟萘酸噻嘧啶 652mg

**【包装】**

**【贮藏】** 20~25 $^{\circ}$ C遮光保存，可在15~30 $^{\circ}$ C内短途运输。

**【有效期】** 3年

**【进口兽药注册证号】**

**【生产企业】** 默沙东公司 (MERCK SHARP & DOHME DE PUERTO RICO INC)

地址：P.O.Box 601, Rd#2 KM.56.7, Barceloneta, Puerto Rico 00617

## (二) 伊维菌素双羟萘酸噻嘧啶咀嚼片标签

兽用

**【兽药名称】**

通用名称：伊维菌素双羟萘酸噻嘧啶咀嚼片

商品名称：犬心保 (Heartgard<sup>®</sup> Plus)

英文名称：Ivermectin and Pyrantel Pamoate Chewable Tablets

汉语拼音：Yiweijunsu Shuangqiangnaisuan Saimiding Jujuepian

**【适应证】** 通过清除犬心丝虫幼虫来预防犬心丝虫病，治疗和控制犬蛔虫（犬弓首蛔虫、狮弓蛔虫）病和钩虫（犬钩口线虫、狭头钩口线虫、巴西钩口线虫）病。

**【用法与用量】** 以本品计。口服：体重在11kg以下的犬，S片一片，体重在12~22kg的犬，M片一片，体重在23~45kg的犬，L片一片，体重在45kg以上的犬可用不同规格片配合使用。每月一次。

**【休药期】** 无。

**【规格】**

**【包装】**

**【生产日期】**

**【生产批号】**

**【有效期至】**

**【贮藏】** 20~25℃遮光保存，可在15~30℃内短途运输。

**【生产企业】** 默沙东公司（MERCK SHARP & DOHME DE PUERTO RICO INC）

地址：P.O.Box 601, Rd#2 KM.56.7, Barceloneta, Puerto Rico 00617