

附件 2 (略)

附件 3

鸡传染性法氏囊病病毒火鸡疱疹病毒载体活疫苗 (vHVT-013-69 株) 等 4 种兽药产品说明书和标签

一、鸡传染性法氏囊病病毒火鸡疱疹病毒载体活疫苗 (vHVT-013-69 株) 说明书和标签

(一) 鸡传染性法氏囊病病毒火鸡疱疹病毒载体活疫苗 (vHVT-013-69 株) 说明书

兽用

【兽药名称】

通用名 鸡传染性法氏囊病病毒火鸡疱疹病毒载体活疫苗 (vHVT-013-69 株)

商品名 立克法

英文名 Bursal Disease - Marek's Disease Vaccine, Serotype 3, Live Marek's Disease Vector

汉语拼音 Ji Chuanranxingfashinangbingbingdu Huojipaozhenbingdu Zaiti Huoyimiao
(vHVT-013-69 Zhu)

【主要成分与含量】 每羽份疫苗含表达鸡传染性法氏囊病病毒 VP2 蛋白的重组火鸡疱疹病毒 vHVT-013-69 株至少 3880 PFU。

【性状】 淡红色细胞悬液。

【作用与用途】 用于预防鸡马立克氏病和传染性法氏囊病。

【用法与用量】 用于接种 18~19 日龄鸡胚或颈背部皮下接种 1 日龄雏鸡。接种 18~19 日龄鸡胚时, 每只鸡胚 0.05ml; 接种 1 日龄雏鸡时, 每只 0.2ml。

将疫苗安瓿置 20~30℃ 水中快速解冻, 再用无菌注射器将疫苗注入适量稀释液中稀释。用于鸡胚接种时, 每 4000 羽份疫苗用 200ml 稀释液稀释; 用于皮下接种时, 每 1000 羽份疫苗用 200ml 稀释液稀释。

【不良反应】 一般无可见的不良反应。

【注意事项】 (1) 仅用于接种健康鸡或鸡胚。

(2) 在接种过程中或接种后, 避免鸡群应激。

(3) 稀释疫苗时, 应通过旋转或倒转容器的方法使疫苗与稀释液充分混匀, 切勿剧烈振荡。

(4) 疫苗开启后应一次用完, 疫苗稀释后应 1 小时内用完。

(5) 接种设备需通过 121℃ 高压灭菌至少 15 分钟, 或水浴煮沸至少 20 分钟消毒。勿接触化学消毒剂。

(6) 用过的疫苗瓶、器具和未用完的疫苗等应进行无害化处理。

(7) 屠宰前 21 日内禁用。

【规格】 (1) 1000 羽份/瓶 (2) 2000 羽份/瓶 (3) 4000 羽份/瓶

【贮藏与有效期】 液氮中保存，有效期为 36 个月。

【《进口兽药注册证书》证号】

【生产企业】 梅里亚有限公司（美国）（MERIAL, Inc.）

地址 1730 Olympic Drive Athens, GA 30601

仅在兽医指导下使用

（二）鸡传染性法氏囊病病毒火鸡疱疹病毒载体活疫苗（vHVT-013-69 株）
内包装标签

兽用

立克法

鸡传染性法氏囊病病毒火鸡疱疹病毒载体活疫苗（vHVT-013-69 株）

1000（2000、4000）羽份/瓶

《进口兽药注册证书》证号：

批 号：

有效期至：

梅里亚有限公司（美国）（MERIAL, Inc.）

二、氯前列醇钠注射液说明书和标签

（一）氯前列醇钠注射液说明书

兽用

【兽药名称】

通用名称 氯前列醇钠注射液

商品名称 卜安得注射液

英文名称 Cloprostenol Sodium Injection

汉语拼音 Lùqiánliéchūnnà Zhùshēyè

【主要成分】 氯前列醇钠

【性状】 本品为无色澄明的液体。

【药理作用】 氯前列醇钠是合成的前列腺素似物，具有溶黄体作用，从而使动物进入正常的发情周期、排卵。注射给药后，血液中的含量在 1 小时后达到高峰，其半衰期视物种不同而有差异，一般为 1~3 小时，大多数动物在给药 24 小时后能全部排出体外。

【适应证】 用于怀孕母猪和初产母猪分娩。

【用法与用量】 深部肌肉注射，一次量，猪，2ml

【注意事项】

（1） 只能在预产期 2 天前使用，严禁过早使用。

（2） 本品只适用于保存有准确配种记录的猪场。

- (3) 本品可通过皮肤吸收，因而在使用本品时要小心，尤其是育龄妇女和气（哮）喘病人，避免接触皮肤、眼睛或衣服。
- (4) 操作时配戴橡胶或一次性防护手套，操作完毕及在饮水或饭前，用肥皂和水彻底清洗。
- (5) 皮肤上粘溅本品，应立即用大量清水冲洗干净。
- (6) 如果偶尔吸入或注射本品引起呼吸困难，建议吸入速效舒张支气管药，如舒喘宁。
- (7) 本产品产生的废弃物应在批准的废物处理设备中处理。严禁在现场处置未稀释的化学品，勿污染饮水、饲料和食品。
- (8) 本品后开启，应在 28 日内用完。
- (9) 本品用完后，空瓶应深埋或焚毁。

【休药期】 24 小时。

【规格】 20ml:1.84mg

【贮藏】 25℃以下，遮光、密闭，干燥处保存。

【有效期】 2 年。

【进口兽药注册证号】

【生产企业】 德国弗里索伊特兽医制药股份有限公司（Vet Pharma Friesoythe GmbH）

地址：Sedelsberger Str.2-4, 26169 Friesoythe, Lower Saxony, Germany

（二）氯前列醇钠注射液标签

兽用

【兽药名称】

通用名称 氯前列醇钠注射液

商品名称 卜安得注射液

英文名称 Cloprostenol Sodium Injection

汉语拼音 Lùqiánliéchūnnà Zhùshēyè

【主要成分】 氯前列醇钠。

【适应证】 用于怀孕母猪和初产母猪分娩。

【用法与用量】 深部肌肉注射，一次量，猪 2ml。

【休药期】 24 小时。

【贮藏】 25℃以下，遮光、密闭，干燥处保存。

【规格】 20ml:1.84mg

【生产日期】

【生产批号】

【有效期至】

【进口兽药注册证号】

【生产企业】 德国弗里索伊特兽医制药股份有限公司(Vet Pharma Friesoythe GmbH)

地址：Sedelsberger Str.2-4, 26169 Friesoythe, Lower Saxony, Germany

三、普鲁卡因青霉素、萘夫西林钠、硫酸双氢链霉素乳房注入剂（干奶期）说明书和标签

（一）普鲁卡因青霉素、萘夫西林钠、硫酸双氢链霉素乳房注入剂（干奶期）说明书

兽用

【兽药名称】

通用名称：普鲁卡因青霉素、萘夫西林钠、硫酸双氢链霉素乳房注入剂（干奶期）

商品名称：乃扶舒（Nafpenzal DC）

英文名称：Procaine benzylpenicillin and Nafcillin Sodium and Dihydrostreptomycin Sulphate Intramammary Ointment (Dry cow)

汉语拼音：Pulukayingmeisu Naifuxilinna Liusuan Shuangqing lianmeisu Rufang Zhuruji (Gannaiqi)

【主要成分】 普鲁卡因青霉素、萘夫西林钠、硫酸双氢链霉素

【性状】 本品为白色或类白色软膏。

【药理作用】 抗生素类药。本品对普通乳房炎病原体具有广谱抗菌作用。如：青霉素敏感型金黄色葡萄球菌、耐青霉素型金黄色葡萄球菌、停乳链球菌、无乳链球菌、凝固酶阴性葡萄球菌、乳房链球菌、微球菌、大肠杆菌、克雷伯菌属、化脓-隐秘杆菌和蜡状芽孢杆菌。

【适应证】 主要用于治疗干奶期奶牛由葡萄球菌、链球菌或革兰氏阴性菌引起的亚临床型乳房炎和预防干奶期奶牛对青霉素、萘夫西林和/或双氢链霉素敏感的细菌引起的乳房炎。

【用法和用量】 以本品计。乳房灌注：干奶期奶牛每个乳区，1支。

【不良反应】 （1）注入、吸入或皮肤接触普鲁卡因青霉素、萘夫西林或双氢链霉素可能会产生过敏反应（变态反应）。

（2）对头孢菌素类过敏的机体可能产生对青霉素的交叉过敏和不良反应。

【注意事项】 （1）仅用于干奶期奶牛。

（2）对β-内酰胺类抗生素或双氢链霉素过敏的动物禁用。

（3）与抑菌剂同时使用，可能有拮抗作用。

（4）在注射之前，乳汁要完全挤出，乳头和乳头孔用干净的毛巾彻底清理干净。

（5）使用一次性注射器。给药后，轻轻按摩乳房和乳头，使药物完全扩散。

（6）使用时尽量避免接触本品：操作员如对本品过敏，请停止使用；如果接触后发现皮疹或脸部、嘴唇和眼睛肿胀、呼吸困难症状，请立即就医。

【休药期】 牛 14 日。泌乳期禁用。产犊前 42 日内禁用。弃奶期 1.5 日。

【规格】 3g：普鲁卡因青霉素 300mg+萘夫西林 100mg+双氢链霉素 100mg

【包装】

【贮藏】 25℃以下保存，勿冷冻。

【有效期】 2 年

【进口兽药注册证号】

【生产企业】 英特威国际有限公司 (Intervet International B.V.)

地址: Wim de Körverstraat 35, Boxmeer the Netherlands

(二) 普鲁卡因青霉素、萘夫西林钠、硫酸双氢链霉素乳房注入剂(干奶期)外包装

标签

兽用

【兽药名称】

通用名称: 普鲁卡因青霉素、萘夫西林钠、硫酸双氢链霉素乳房注入剂(干奶期)

商品名称: 乃扶舒 (Nafpenzal DC)

英文名称: Procaine benzylpenicillin and Nafcillin Sodium and Dihydrostreptomycin Sulphate Intramammary Ointment(Dry cow)

汉语拼音: Pulukayingqingmeisu Naifuxilina Liusuan Shuangqing lianmeisu Rufang Zhuruji (Gannaiqi)

【主要成分】 普鲁卡因青霉素、萘夫西林钠、硫酸双氢链霉素

【适应证】 主要用于治疗干奶期奶牛山葡萄球菌、链球菌或革兰氏阴性菌引起的亚临床型乳房炎和预防干奶期奶牛对青霉素、萘夫西林和/或双氢链霉素敏感的细菌引起的乳房炎。

【用法和用量】 以本品计。乳房灌注: 干奶期奶牛每个乳区, 1支。

【休药期】 牛 14 日。泌乳期禁用。产犊前 42 日内禁用。弃奶期 1.5 日。

【规格】 3g: 普鲁卡因青霉素 300mg+萘夫西林 100mg+双氢链霉素 100mg

【包装】

【生产日期】

【生产批号】

【有效期至】

【贮藏】 25℃以下保存, 勿冷冻。

【进口兽药注册证号】

【生产企业】 英特威国际有限公司 (Intervet International B.V.)

地址: Wim de Körverstraat 35, Boxmeer the Netherlands

(三) 普鲁卡因青霉素、萘夫西林钠、硫酸双氢链霉素乳房注入剂(干奶期)内包装

标签

兽用

【规格】 3g: 普鲁卡因青霉素 300mg+萘夫西林 100mg+双氢链霉素 100mg

【包装】

【生产日期】

【生产批号】

【贮藏】 25℃以下保存，勿冷冻。

【进口兽药注册证号】

【生产企业】 英特威国际有限公司（Intervet International B.V.）

地址：Wim de Körverstraat 35, Boxmeer the Netherlands

四、地克珠利预混剂说明书和标签

（一）地克珠利预混剂说明书

地克珠利预混剂说明书

兽用

【兽药名称】

通用名：地克珠利预混剂

商品名：伏球 0.5%（CLINACOX 0.5%）

英文名：Diclazuril Premix

汉语拼音：Dikezhuli Yühunji

【主要成分】 地克珠利

【性状】 本品为淡黄色至琥珀色粉末；有豆粉气味。

【药理作用】 本品为三嗪类新型广谱抗球虫药，具有杀球虫作用，对球虫发育的各个阶段均有作用，是目前作用最强的一种抗球虫药，对鸡的柔嫩、堆型、毒害、布氏、巨型等艾美耳球虫均有良好的效果，其效果优于大多数目前常用的抗球虫药。地克珠利的作用峰期是在孢子体和第一代裂殖体的早期阶段。地克珠利的缺点是长期用药易出现耐药性，故应与其他抗球虫药交替使用。

【适应证】 用于预防禽、兔球虫病。

【用法与用量】 以地克珠利计。混饲：每 1000kg 饲料，禽、兔 1g。

【注意事项】 （1）本品药效期短，停药 1 日，抗球虫作用明显减弱，两日后作用基本消失。因此，必须连续用药以防球虫病再度暴发。

（2）本品混料浓度极低，药料应充分拌匀，否则影响疗效。

（3）蛋鸡产蛋期禁用。

（4）操作人员在混合或处理本品时，应穿防护服、戴手套、防尘面罩和护目镜。

（5）置于儿童接触不到的地方。

【休药期】 禽 5 日；兔 14 日。

【规格】 100g：0.5g

【包装】 20kg/袋

【贮藏】 遮光，密闭，在干燥处保存。

【有效期】 二年。

【进口兽药注册证书】

【生产企业】 美国礼来公司 Elanco 动物保健部保加利亚生产厂（Elanco Animal Health,

A Division of Eli Lilly and Company, Bulgaria)

地址：39, Petar Rakov Street, Peshtera 4550, Bulgaria

(二) 地克珠利预混剂标签

兽用

【兽药名称】

通用名：地克珠利预混剂

商品名：伏球 0.5% (CLINACOX 0.5%)

英文名：Diclazuril Premix

汉语拼音：Dikezhuli Yuhunji

【主要成分】 地克珠利

【适应证】 用于预防禽、兔球虫病。

【用法与用量】 以地克珠利计。混饲：每 1000kg 饲料，禽、兔 1g。

【休药期】 禽 5 日；兔 14 日。

【规格】 0.5%

【包装】 20kg/袋

【贮藏】 遮光，密闭，在干燥处保存。

【进口兽药注册证书】

【生产日期】

【生产批号】

【有效期至】

【生产企业】 美国礼来公司 Elanco 动物保健部保加利亚生产厂 (Elanco Animal Health,

A Division of Eli Lilly and Company, Bulgaria)

地址：39, Petar Rakov Street, Peshtera 4550, Bulgaria